


วิธีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแก่งคอย	เลขที่ CPG-PCT-031 แก้ไขครั้งที่ 02	ฉบับร่าง หน้า 2 ของ 3
------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------

แนวทางการดูแลผู้ป่วย Warfarin Clinic

เมื่อโรงพยาบาลสระบุรีประเมินผู้ป่วยที่รับยาใน Warfarin Clinic ว่ามีค่า INR อยู่ในระดับเป้าหมายคองที่นานเกิน 6 เดือน จะส่งกลับมารับยาต่อในโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีรายชื่อผู้ป่วยส่งตัวกลับ ใบส่งตัวในโปรแกรม warfarin.srb.in.th และสมุดประจำตัวผู้ป่วยส่งกลับมายังโรงพยาบาลแก่งคอย

ระบบบริการใน Warfarin Clinic โรงพยาบาลแก่งคอย



สถานะเอกสาร	จัดทำโดย วันที่ 10 ตุลาคม 2560
	ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ PCT
	อนุมัติ..... วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่บังคับใช้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ PCT

วิธีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแก่งคอย	เลขที่ CPG-PCT-031 แก้ไขครั้งที่ 02	ฉบับร่าง หน้า 3 ของ 3
------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------

กรณีผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แพทย์จะพิจารณานัดเจาะเลือดประจำปี ผู้ป่วยจะได้รับการนัดหมายให้มาเจาะเลือดในช่วงเช้า และนัดฟังผลพร้อมเข้าตรวจตามเวลา Warfarin Clinic ในช่วงบ่าย

เกณฑ์การพิจารณาเพิ่ม/ลดขนาดยา ตามระดับ INR

ระดับ ค่าINR	การบริหารยา
< 1.5	▲ 10 - 20%
1.5 - 1.9	▲ 5 - 10%
2.0 - 3.0	Continue same dose
3.1 - 3.9	▼ 5 - 10%
4.0 - 4.9	Hold for 1 day then ▼ 10%
5.0 - 8.9 , no bleeding	Omit 1 - 2 dose, Vit K ₁ 1 mg orally
≥ 9.0 , no bleeding	Vit K ₁ 5 - 10 mg orally
Major bleeding with any INR	Vit K ₁ 10 mg IV plush FFP Repeat Vit K ₁ every 12 hours if needed

สถานะเอกสาร	จัดทำโดย วันที่ 10 ตุลาคม 2560
	ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ PCT
	อนุมัติ..... วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่บังคับใช้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ PCT